

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	BENJI 250 SP
<i>Type de formulation</i>	SP-Poudre soluble
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Acetamipride : 250 g/kg
<i>Usage</i>	Insecticide

BENJI 250 SP est une formulation prête à l'emploi pour le traitement par pulvérisation foliaire du coton et des cultures maraîchères, fruitières et florales.

MODE D'ACTION

BENJI 250 SP contient 250g/kg d'acetamipride, insecticide de la famille des neonicotinoides, groupe IRAC 4a.

L'acétamipride, agit par contact et ingestion sur le système nerveux central, causant le blocage irréversible du récepteur nicotinique du neurotransmetteur acétylcholine. Il interrompt la transmission nerveuse chez les insectes, résultant en pulses rapides dues à un influx de sodium continu, causant hyper excitation, convulsions, paralysie et mort.

Son effet choc, ses propriétés translaminaires et systémiques lui confèrent une efficacité accrue sur les ravageurs cibles ainsi qu'une très bonne tenue au lessivage et une bonne persistance d'action.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement du coton, des cultures maraîchères, fruitières et florales est important pour obtenir un bon rendement car elles sont particulièrement attractives pour les agents pathogènes et insectes parasites.

Principales cibles visées

BENJI 250 SP permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes piqueurs-suceurs (aleurodes, pucerons) ainsi que contre les mineuses et certains lépidoptères. BENJI 250 SP peut être utilisé sur les légumes feuilles, fruits, les arbres fruitiers et les cultures florales.

Stratégies conseillées

La dose préconisée est de 100g/ha par hectare.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	Aleurodes, Pucerons, Mineuses, Thrips, Jassides, Cochenilles	100-200 g/ha	Traiter dès l'apparition des ravageurs cibles. Renouveler l'application après 7-14 si nécessaire. 2 appl. Max. par campagne.	7j	6h
Tomate, Poivron, Piment, Gombo				Sous serre : 7j Champ : 3j	
Cucurbitacées à peau non comestible, Salades, PdT				7j	
Cucurbitacées à peau comestible				3j	
Choux, Oignon				14j	
Arboriculture				14j	
Toutes cultures	Termites	Solution à 1%	Soit 2 sachets de 5g pour 1 litre d'eau.	n/a	n/a

Traitement de base :

Verser la moitié de l'eau dans le pulvérisateur. Ajouter BENJI 250 SP selon la dose recommandée et bien remuer le pulvérisateur. Compléter le remplissage avec de l'eau. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de BENJI 250 SP selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Mesure de première urgence

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré. Ne pas manger, ne pas boire ou fumer.

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter d'urgence un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire de l'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.