

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	METRIBUSAV 210 SC
<i>Type de formulation</i>	SC – Suspension concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	210 g/l de metribuzine
<i>Usage</i>	Herbicide

METRIBUSAV 210 SC est un herbicide de post-levée, utilisable contre un grand nombre de dicotylédones et de graminées annuelles.

MODE D'ACTION

METRIBUSAV 210 SC contient 210g/l de metribuzine, matière active de la famille des triazinones, groupe HRAC-5.

METRIBUSAV 210 SC est un herbicide de post-levée qui est absorbé principalement par les feuilles mais également par les racines. La métribuzine agit par inhibition de la photosynthèse en perturbant le fonctionnement du photosystème II. METRIBUSAV 210 SC est efficace sur un grand nombre de dicotylédones mais aussi sur les graminées. La persistance d'action est de 4-5 mois.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Carotte	1 l/ha	Traiter sur sol humide, 30 jours après semis	30j	6h
Tomate en extérieur	2.5 l/ha	Traiter sur sol humide en préplantation ou prélevée de la culture et des adventices. 1 appl. Max / an.	n/c	
Pomme de terre				
Canne à sucre	4.5 l/ha	Traiter en postplantation et prélevée des adventices. 1 appl. Max / an		

Le mode d'emploi de METRIBUSAV 210 SC varie selon la flore présente et le type de sol. Lors d'une première utilisation, pulvériser une petite partie de la culture afin de vérifier qu'il n'y a pas de problème de sélectivité.

Il existe des risques de phytotoxicité dans les sols légers et/ou si une pluie survient dans les 24h avant ou après le traitement.

Cultures de remplacement : 1 mois après labour, il est possible d'implanter des pommes de terre ou des tomates repiquées uniquement.

En cas de rotation avec de la laitue ou des crucifères, s'assurer qu'il ne reste plus d'herbicide dans le sol.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau à la moitié de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de METRIBUSAV 210 SC. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Nettoyage du matériel après pulvérisation :

Il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1l pour 100l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du METRIBUSAV 210 SC sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans (test 14 jours à 54°C). Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Cependant, si le médecin décide de nettoyer l'estomac, assurer l'évacuation gastrique en assurant la protection des voies respiratoires (risque de pneumopathie aux solvants).

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.