

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	OXI 240 EC
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Oxyfluorène : 240 g/l
<i>Usage</i>	Herbicide

L'OXI 240 EC est un herbicide de post-semis pré-levée et de post-levée efficace sur la majorité des monocotylédones et dicotylédones annuelles.

MODE D'ACTION :

L'OXI 240 EC contient 240g/l d'oxyfluorène, matière active herbicide de la famille des diphenylether, groupe HRAC-14.

L'oxyfluorène agit en inhibant la synthèse de protoporphyrinogen oxidase (PPO), enzyme intervenant dans la synthèse de précurseurs de la chlorophylle et des phytochromes. L'inhibition de la PPO a également un 2^{ème} rôle à savoir l'accumulation de protoporphyrine IX qui s'oxyde et détruit les cellules de la plante dès que celles-ci sont à la lumière.

L'OXI 240 EC est absorbé sur les colloïdes du sol et crée une barrière pour les mauvaises herbes, il agit par contact en détruisant les adventices lorsqu'elles traversent le sol traité.

L'OXI 240 EC a une persistance de plusieurs semaines dans les conditions habituelles d'application et peut être utilisé en pré-levée ou post-levée précoce des adventices.

MODALITES D'EMPLOI

Stratégies conseillées

La dose d'emploi moyenne est de 0.75-1.5l par hectare.

Doses d'emploi et stades d'application

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Oignon semé	0.75-1.5 l/ha	Traiter en pré-émergence sur sol nivelé ou en post-émergence sur des oignons ayant 3-4 feuilles vraies.	45j	6h
Oignon repiqué		Traiter 10-12j après le repiquage une fois que les oignons sont bien enracinés.		

Choux	1 l/ha	Traiter avant repiquage sur sol nivelé.	n/a	6h
Taro		Traiter une semaine après plantation des boutures/tubercules, avant la levée.		

Recommandations d'emploi

OXI 240 EC s'applique préférentiellement sur un sol humide, nivelé et propre. En post-émergence ou après repiquage, traiter de préférence en milieu de journée une fois que les oignons ont secrété de la cire. Remplir le pulvérisateur à moitié puis ajouter la dose d'OXI 240 EC adéquate, enfin, compléter avec de l'eau.

Bien nettoyer le matériel avant et immédiatement après épandage du produit.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation d'OXI 240 EC et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Limites d'emploi

Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas mélanger avec des insecticides ou des fongicides.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les réservoirs bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Retirer les vêtements et les mettre à l'écart.

Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ingestion : Appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Si l'équivalent d'une cuillère est ingéré, prendre du charbon actif. Garder la personne au calme.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique connu. Traitement symptomatique.