

## NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Nom</i>                                | <b>TRIDENT 92 EC</b>                         |
| <i>Type de formulation</i>                | EC – Emulsion concentrée                     |
| <i>Nom et teneur des matières actives</i> | Bifenthrine : 60 g/l<br>Acétamipride : 32g/l |
| <i>Usage</i>                              | Insecticide                                  |

TRIDENT 92 EC est une formulation prête à l'emploi pour le traitement par pulvérisation foliaire des cotonniers.

### MODE D'ACTION :

TRIDENT 92 EC contient 60g/l de bifenthrine, matière active de la famille des pyréthrinoides (groupe IRAC-3a) et 32g/l d'acétamipride, matière active de la famille des néonicotinoïdes (groupe IRAC-4a).

La bifenthrine, agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes et d'acariens. Elle possède également un effet répulsif qui entraîne l'inhibition de la ponte chez les adultes et bloque la prise de nourriture chez les larves.

L'acétamipride, agit sur le système nerveux central, causant le blocage irréversible du récepteur nicotinique du neurotransmetteur acétylcholine. Interrompt la transmission nerveuse chez les insectes, résultant en pulses rapides dues à un influx de sodium continu, causant hyper excitation, convulsions, paralysie et mort.

Les propriétés translaminaires et systémiques de ses matières actives confèrent au TRIDENT 92 EC une très bonne résistance au lessivage ainsi qu'une bonne persistance d'action (3-4 semaines).

### MODALITES D'EMPLOI

#### Objectifs

La protection phytosanitaire du cotonnier est importante pour obtenir un niveau de rendement satisfaisant car elle est particulièrement attractive pour les agents pathogènes et insectes parasites.

#### Principales cibles visées

TRIDENT 92 EC permet de lutter efficacement contre les chenilles de lépidoptères et les insectes piqueurs-suceurs (alurodes, pucerons, jassides...).

#### Stratégies conseillées

Dans un programme fenêtré sur cultures cotonnières, TRIDENT 92 EC s'emploie préférentiellement pour les traitements de 3<sup>ème</sup> fenêtré, à la dose de 0.5l/ha.

| Culture | Usage                                                                                                         | Dose préconisée | Indications d'utilisation                                 | Délai avant récolte | Délai de rentrée |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Coton   | H. armigera, Earias spp., D. watersi<br>S. litoralis, S. derogata, aleurodes,<br>pucerons, jassides, acariens | 0,5l/ha         | Traiter selon les recommandations des services techniques | 14j                 | 24h              |

#### *Traitement de base :*

En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de TRIDENT 92 EC et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

#### **Précautions**

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de TRIDENT 92 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

#### **AUTRES INFORMATIONS**

##### **Stabilité à l'entreposage**

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

##### **Mesures de sécurité**

##### *Précautions à prendre*

Eviter tout contact avec les yeux et la peau  
Ne pas avaler ou respirer le produit.  
Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.  
Ne pas réutiliser les emballages vides.  
Après le traitement, changer de vêtements et se laver.  
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.  
Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.  
Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

##### *Mesure de première urgence*

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle, apporter de l'oxygène. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement

un médecin.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon les parties exposées de la peau. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières pendant 15 min. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin. Si la victime est consciente, rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

#### *Antidote et équivalents*

Pas d'antidote connu. Traiter symptomatiquement.