

GROUPE
savana



Composition

Difenoconazole : 250 g/l

Famille chimique

Triazoles – FRAC-3

Formulation

EC – Emulsion Concentrée

Mode d'action

Systémique / Préventif / Curatif

Cultures

Maraîchères, Fruitières et Vivrières

Cible

Champignons pathogènes

Mode d'application

Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 10-15 jours. 3 applications max. par campagne.

Dose

0.5 l/ha

DIFENOSAV® 250 EC

Fongicide systémique à large spectre

■ **EFFICACITÉ :**

- La référence sur les maladies de l'oignon.
- Un rempart contre l'oïdium.

■ **POLYVALENCE :**

- Adapté à de nombreuses cultures.
- Utilisable par traitement foliaire, par irrigation goutte à goutte et/ou par trempage.

Fongicide

DIFENOSAV[®] 250 EC

Fongicide systémique à large spectre

OBJECTIFS

Le traitement des cultures maraîchères, fruitières et vivrières contre les maladies est indispensable pour obtenir un bon rendement. Utiliser **DIFENOSAV 250 EC** permet de protéger les cultures contre les champignons phytopathogènes susceptibles de s'y développer.

PRINCIPALES MALADIES VISÉES

DIFENOSAV 250 EC est efficace contre les espèces de micromycètes parasites provoquant des maladies cryptogamiques comme :

EXEMPLES :



Oïdium
(ex. : Tomate)




Alternariose
(ex. : Aubergine)



Anthracnose
(ex. : Oignon)



Stemphylium
(ex. : Oignon)



Rouille
(ex. : Poireau)

MODE D'ACTION

DIFENOSAV 250 EC contient 250 g/l de difenoconazole, matière active de la famille des triazoles, groupe FRAC-3, seul fongicide DMI autorisé au CSP.

DIFENOSAV 250 EC, fongicide systémique à action préventive et curative, a un très large spectre d'efficacité contre les champignons pathogènes. Il agit en inhibant la synthèse des membranes cellulaires ce qui empêche le développement du champignon dans son ensemble et entraîne sa mort. Il a une bonne persistance d'action, de l'ordre de 2 à 3 semaines.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cultures maraîchères	Anthracnose, Rouille, Alternariose, Oïdium, Rhizoctone, Stemphylium	0.5 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 10 à 15 jours. 3 applications max. par campagne.	14j (tomate 7j)	6h
Cultures fruitières	Moniliose, Oïdium, Cercosporiose, Anthracnose		Traiter dès les premiers risques d'attaque. 3 applications max. par campagne	21j	

Soit une quantité de 25 ml de **DIFENOSAV 250 EC** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **DIFENOSAV 250 EC** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur!



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits