

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	FONGICUR
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Hexaconazole 50 g/l
<i>Usage</i>	Fongicide

FONGICUR est un fongicide à large spectre pour lutter contre les maladies des cultures maraîchères et fruitières, et des céréales.

MODE D'ACTION

FONGICUR contient 50 g/l d'hexaconazole, matière active de la famille des triazoles, groupe FRAC-3.

Le FONGICUR, fongicide systémique à action préventive et curative, a un très large spectre d'efficacité contre les champignons pathogènes. Il agit en inhibant la synthèse des membranes cellulaire ce qui empêche le développement du champignon dans son ensemble et entraîne sa mort. Il a une bonne persistance d'action, de l'ordre de 2 à 3 semaines.

MODALITES D'EMPLOI

Principales cibles visées

FONGICUR a un très large spectre et est efficace sur de nombreux champignons pathogènes. On peut l'employer sur cultures maraîchères, fruitières et vivrières.

Stratégies conseillées

La dose préconisée est de 0.5 litre par hectare, à adapter en fonction des conditions locales.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cultures maraîchères	Anthraxnose Rouille, Alternariose, Oïdium, Rhizoctone, Pourriture grise	0.5 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 10 à 15 jours. 3 appl. Max / campagne.	10j	8h
Cultures fruitières	Moniliose, Oïdium, Cercosporiose, Pourriture grise, Anthraxnose			14j	
Cultures vivrières	Rouille, Oïdium, Septoriose, Pyriculariose, Rhizoctone, Helminthosporiose			30j	

Traitement de base :

FONGICUR s'utilise en pulvérisation foliaire classique. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié puis ajouter la dose adéquate de FONGICUR, bien remuer, puis compléter le volume restant avec de l'eau.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de FONGICUR selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau
Ne pas avaler ou respirer le produit.
Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.
Ne pas réutiliser les emballages vides.
Après le traitement, changer de vêtements et se laver.
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.
Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.
Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire 1-2 verres d'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.