

GROUPE
savana



PROLEV®

Fongicide systémique pour les maladies
du sol

PROTEGE LA LEVÉE !

■ **Unique :**

Seul fongicide pour lutter contre les maladies
telluriques

■ **Souplesse d'emploi :**

Utilisable au semis, au repiquage, en cours de
culture

■ **Alternative :**

Un mode d'action différent pour lutter contre le
mildiou

Composition

Propamocarbe : 722 g/l

Famille chimique

Carbamates – FRAC-F4

Formulation

SL – Concentré Soluble

Mode d'action

Systémique / Préventif et curatif

Cultures

Maraîchères, Fruitières et Vivrières

Cible

Champignons pathogènes

Mode d'application

Traiter au moment du semis et répéter
le traitement après 7-10j si nécessaire.
2 applications max. par campagne.

Dose

Solution à 0.1%

Fongicide

PROLEV®

Fongicide systémique pour les maladies du sol et le mildiou

OBJECTIFS

Le traitement des cultures maraîchères, fruitières et vivrières contre les maladies est indispensable pour obtenir un bon rendement. Utiliser **PROLEV** permet de protéger les cultures contre les champignons phytopathogènes susceptibles de s'y développer.

PRINCIPALES MALADIES VISÉES

PROLEV est efficace contre les espèces de micromycètes parasites provoquant des maladies cryptogamiques comme :

EXEMPLES :



Mildiou



Fonte de semis



Pourriture des racines

MODE D'ACTION

PROLEV contient 722 g/l de propamocarbe chlorhydrate, matière active de la famille des carbamates, groupe FRAC-28.

PROLEV, fongicide systémique absorbé par les racines et les feuilles, est très efficace contre les champignons pathogènes de la famille des phycomyètes. **PROLEV** exerce son action en inhibant la biosynthèse des acides gras et des phospholipides ce qui modifie la perméabilité membranaire et entraîne l'arrêt de la croissance du mycelium ainsi que l'arrêt du développement des spores.

Utilisé en traitement du sol, ses propriétés systémiques permettent de protéger également les jeunes plants jusqu'à 21j après levée.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Tomate, Concombre, Chou, Pomme de terre	Mildiou	1-2 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 10 à 14 jours. 2 applications max. par campagne.	7j	48h
Cucurbitacées, Solanacées	Fonte de semis, Pourriture des racines	Solution 0.1%	Traiter au moment du semis et répéter le traitement après 7-10j si nécessaire. 2 applications max. par campagne.	n/a	

Traitement foliaire : 50-100ml de **PROLEV** dans 15 litres d'eau pour un volume de 300l/ha de bouillie. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié avec de l'eau puis ajouter le volume adéquat de **PROLEV**. Bien mélanger puis compléter avec de l'eau jusqu'au volume désiré. Remuer régulièrement pendant l'application.

Traitement du sol : 10ml de **PROLEV** dans 10 litres d'eau et 100-200ml par plant. Faire l'application par trempage direct sur le milieu d'enracinement. Remarque : en petit paysannat, appliquer 5l de solution par m² de surface.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **PROLEV** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits