

GROUPE
savana



Composition

linuron : 500 g/kg

Famille chimique

Urées substituées – HRAC-5

Formulation

WP – Poudre mouillable

Mode d'action

Systémique

Cultures

Carotte

Cible

Adventices dicotylédones et graminées

Mode d'application

Application unique : Traiter sur sol humide au stade 2-3 feuilles vraies.

Dose

0.8 - 1.2 kg/ ha

TROMISSIL® 50 WP

Herbicide de pré et post-levée

- *Un seul passage suffit*
- *Idéal en postlevée*
- *Contrôle l'ensemble des mauvaises herbes et notamment les cypéracées*
- *Pratique d'emploi : sachet-dose*



HORIZON PHYTO PLUS

Avec HPP, Vous avez droit au Meilleur !

Siège social : Z.I Douala - Bonaberi, face Cimencam
Agences : Garoua - Yaoundé - Ngaoundéré - Bafoussam
B.P : 2131 Douala - Cameroun
Tél. : + 237 233 43 69 84 / +237 243 19 29 12
E-mail : horizonphyto@horizonphytoplus.com

Herbicide

TROMISSIL® 50 WP

Herbicide de pré et post-levée

OBJECTIFS

Le désherbage de pré et post-levée vise à empêcher la concurrence des adventices et garantir un rendement optimal.

PRINCIPALES ADVENTICES VISÉES

Monocotylédones (graminées) : *Brachiaria deflexa*, *Brachiaria lata*, *Chloris pilosa*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Digitaria horizontalis*, *Eleusine indica*, *Eragrostis aspera*, *Fimbristylis hispidula*, *Hackelochloa granularis*, *Paspalum scrobiculatum*, *Pennisetum pedicellatum*, *Rottboellia exaltata*, *Setaria pallide-fusca*, *Setaria pumila*.

Dicotylédones : *Acalypha segetalis*, *Ageratum conyzoides*, *Cassia obtusifolia*, *Celosia argentea*, *Citrullus lanatus*, *Corchorus tridens*, *Crotalaria retusa*, *Hibiscus asper*, *Hyptis spicigera*, *Indigofera pilosa*, *Ipomoea eriocarpa*, *Ludwigia abyssinica*, *Mitracarpus villosus*, *Oldenlandia corymbosa*, *Physalis angulata*, *Sida acuta*, *Spermacoce ruelliae*, *Stachytarpheta angustifolia*, *Veronia galamensis*.

EXEMPLES :

Monocotylédones



Brachiaria spp.



Paspalum scrobiculatum



Dactyloctenium aegyptium



Cyperus rotundus

Dicotylédones



Ipomoea eriocarpa



Stachytarpheta angustifolia

TROMISSIL 50 WP s'emploie préférentiellement en postlevée de la culture et des adventices, au stade 2-3 feuilles vraies de la carotte et en conditions poussantes (sol humide) et est efficace sur de nombreuses monocotylédones (à partir d'1 feuille) et dicotylédones (à partir de la levée).

MODE D'ACTION

TROMISSIL 50 WP contient 500g/kg de linuron, matière active de la famille des urées substituées, groupe HRAC-5.

TROMISSIL 50 WP est un herbicide de prélevée et de postlevée absorbé principalement par les racines mais également par les feuilles. Il agit par inhibition de la photosynthèse en perturbant le fonctionnement du photosystème II. TROMISSIL 50 WP est efficace sur un grand nombre de dicotylédones mais aussi sur les graminées. La persistance d'action est de 1-2 mois.

MODE D'EMPLOI

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Carotte	0.8 - 1.2 kg/ha	Application unique : traiter sur sol humide au stade 2-3 feuilles vraies.	30j	8h

Soit 1 sachet de 60g de **TROMISSIL 50 WP** pour 2 pulvérisateurs et 26-40 pulvés/ha..

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **TROMISSIL 50 WP** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits