



GROUPE
savana

M3TM

FRUIT FLY BAIT STATION

PIÈGE ATTRACTIF / INSECTICIDE

PRÊT À L'EMPLOI, POUR LUTTER CONTRE
LES MOUCHES DES FRUITS.



QU'EST CE QUE LE M3™ ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?


M3 Fruit Fly Bait Station est une station de piégeage en plastique contenant une mousse polyuréthane imprégnée d'une solution contenant un attractif spécifique des mouches de fruits (hydrolysate de protéine) et d'alphacyperméthrine. L'alphacyperméthrine agissant par contact et ingestion et ayant un effet choc, les insectes attirés sur M3 Fruit Fly Bait Station sont tués en absorbant la matière active. L'hydrolysate de protéines est un attractif alimentaire qui attire spécifiquement les mouches des fruits du genre *Ceratitis* et *Bactrocera*, et notamment les femelles. En effet, celles-ci ont un grand besoin de nourriture pendant les périodes de reproduction et c'est pourquoi elles sont attirées par l'hydrolysate de protéines. Par ailleurs, M3 Fruit Fly Bait Station a une persistance de 16 semaines minimum.

AVANTAGES

- Très efficace contre les mouches des fruits du genre *Ceratitis* spp et *Bactrocera* spp
- Contient un attractif alimentaire hautement spécifique
- Facile à appliquer, prêt à l'emploi
- Longue persistance d'action (16 semaines minimum)
- Respectueux de l'environnement, inoffensif pour la faune auxiliaire
- Ne laisse aucuns résidus (LMR), pas de délais avant récolte (DAR)
- 100% compatible avec un Programme de Lutte Intégrée / Agriculture biologique
- Résistant à la pluie
- Rechargeable



LE CYCLE DE VIE DE LA MOUCHE



Les mouches piquent les fruits à l'aide de leur ovipositeur pour y déposer leurs oeufs (plusieurs dizaines) à faible profondeur. Dès leur éclosion, les asticots se nourrissent de la pulpe pendant plusieurs jours avant de quitter le fruit pour s'enfouir dans le sol et de se transformer en pupes. De cette pupes sortira une mouche adulte. Les fruits à peau tendre sont très attaqués par les mouches.



Ceratitis



Bactrocera

CONSEILS D'UTILISATION

Quand : appliquer lorsqu'une infestation est détectée (monitoring) et/ou lorsque les fruits commencent à se former. Continuer le traitement jusqu'à éradication des mouches. Les fruits tombés au sol doivent être ramassés et détruits.

Comment : sortir le piège de son sachet et le suspendre à une branche. Choisir un point d'accroche à l'intérieur du feuillage (à 1,5m de hauteur minimum), du côté ombragé. Il est important de veiller à ce que les pièges soient suspendus à l'horizontale et qu'ils puissent se balancer librement ; cela évitera qu'ils ne se dessèchent prématurément.

Combien : répartir de manière régulière 100-200 pièges par hectare. Recharger les pièges après 16 semaines si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Porter des gants pour manipuler les pièges.

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de combiner l'utilisation de **M3 FRUIT FLY BAIT STATION™** avec des blocs attractifs, tel que l'**INVADER-b-LOK™**. Ces blocs imprégnés de para phéromones sexuelles et de malathion visent spécifiquement les mâles de *Bactrocera* spp.

PRODUIT PAR

 **River
Bioscience**

