



GROUPE
savana

INVADER b-LOK™

BLOQUE LES ENVAHISSEURS!

PIÈGE ATTRACTIF / INSECTICIDE

PRÊT À L'EMPLOI, POUR LUTTER CONTRE
LES MOUCHES DES FRUITS.

QU'EST CE QUE L'INVADER-B-LOK™ ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

INVADER-b-LOK™ est un piège insecticide attractif composé d'un bloc de fibre imprégné d'un mélange de méthyl eugénol (attractif) et de malathion (insecticide). Le méthyl eugénol contenu dans l'INVADER-b-LOK™ est hautement attractif pour les mâles de mouches des fruits du genre *Bactrocera* spp. Les mâles ainsi attirés par le méthyl eugénol meurent par contact avec le malathion contenu dans le bloc.


La mort massive des mâles entraînent une chute importante du taux de reproduction de l'espèce contribuant à réduire sa population, réduisant ainsi les infestations des vergers.

AVANTAGES

- Très efficace contre les mouches des fruits, particulièrement *Bactrocera* spp.
- Contient un attractif d'origine naturelle, hautement spécifique
- Facile à appliquer, prêt à l'emploi
- Longue persistance d'action (12 semaines minimum)
- Respectueux de l'environnement, inoffensif pour la faune auxiliaire (oiseaux, poissons, insectes bénéfiques)
- Ne laisse aucun résidu (LMR), pas de délai avant récolte (DAR)
- 100% compatible avec un Programme de Lutte Intégrée / Agriculture biologique



LE CYCLE DE VIE DE LA MOUCHE



Bactrocera invadens

Les mouches piquent les fruits à l'aide de leur ovipositeur pour y déposer leurs oeufs (plusieurs dizaines) à faible profondeur. Dès leur éclosion, les asticots se nourrissent de la pulpe pendant plusieurs jours avant de quitter le fruit pour s'enfouir dans le sol et de se transformer en pupes. De cette pupes sortira une mouche adulte. Les fruits à peau tendre sont très attaqués par les mouches.

CONSEILS D'UTILISATION

Quand : appliquer lorsqu'une infestation est détectée (monitoring) et/ou lorsque les fruits commencent à se former. Continuer le traitement jusqu'à éradication des mouches. Les fruits tombés au sol doivent être ramassés et détruits.

Comment : sortir le bloc de son sachet et le suspendre à une branche. Choisir un point d'accroche à l'intérieur du feuillage, du côté ombragé.

Combien : répartir de manière régulière 12 blocs INVADER-b-LOK™ par hectare. Renouveler les blocs après 12 semaines si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Porter des gants pour manipuler les blocs.

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de combiner l'utilisation de l'INVADER-b-LOK™ avec des pièges attractifs à base d'hydrolysate de protéine, tel que le M3™. Les pièges à base de protéines visent indistinctement les mâles et les femelles.

PRODUIT PAR

