

GROUPE
savana



Composition

S-metolachlore 960 g/l

Famille chimique

Chloroacétamides – HRAC-K3

Formulation

EC – concentré
émulsionnable

Mode d'action

Contact / Systémique /
Racinaire

Cultures

Maïs, coton, arachide, soja,
niébé

Cible

Graminées et dicotylédones

Mode d'application

Application unique post-
semis de la culture et
prélevée des adventices

Dose

0,5-1L / ha

METONYX®

Nouvel herbicide multi-cultures de post-semis / prélevée

- Augmente les rendements en limitant la compétition des mauvaises herbes dès le démarrage de la culture
- Haut niveau d'efficacité même à faible dose
- Longue persistance d'action de 4 à 6 semaines après application
- Pas de résistance connue

Herbicide

METONYX®

Nouvel herbicide multi-cultures de post-semis / prélevée

MODE D'ACTION

METONYX® contient 960g/l de s-metolachlore, matière active herbicide de la famille des chloroacétamides, groupe HRAC-K3.

METONYX® est un herbicide ayant une action sur dicotylédones et sur graminées. C'est un herbicide de post-semis prélevée. Absorbé par le coléoptyle et les racines, le s-metolachlore agit dans les tissus en multiplication en inhibant la synthèse des cires, de la subérine et des gibbérellines, ce qui entraîne la destruction des adventices. Son mode d'action multisite ne présente aucune résistance connue. Sa persistance d'action est de 4-6 semaines.

PRATIQUES CULTURALES

Principales adventices visées : METONYX® est efficace sur de nombreuses graminées et dicotylédones à une dose moyenne de 1 litre par hectare.

Stratégies conseillées

Traitement de base : en post-semis prélevée dans un programme à passage unique. Le cas général est l'utilisation de **1 litre par hectare de METONYX®**.

Dans le cadre d'un programme pré+post en maïs : en post-semis prélevée, utiliser **METONYX®** à la dose de **0.5l/ha**, suivi d'un traitement en post-levée de **NICOMAÏS 40 SC®** (nicosulfuron) ou **SAPHIR®** (rimsulfuron).

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	0.5-1 l/ha	Traiter en post semis – prélevée de la culture et des adventices.	60j	48 h
Maïs, Mil, Sorgho				
Niebe, Arachide, Haricot, Soja				
Canne à sucre	2 l/ha	Traiter en préemergence de la canne.	100j	

Recommandations d'emploi

METONYX® s'applique préférentiellement sur un sol propre et humide en post semis prélevée de la culture. L'incorporation n'est pas conseillée, le travail du sol pouvant réduire l'efficacité herbicide.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de **METONYX®** et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

Précautions

Cultures de remplacement : dans le cas d'un champ accidenté, il est possible de recommencer les cultures autorisées sans restriction.

Cultures suivantes : pas de restriction.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. (test 14 jours à 54 °C). Conserver le récipient bien fermé dans son emballage d'origine.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits