

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	ATRAMAÏS 500 SC
<i>Type de formulation</i>	SC – Suspension concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Atrazine 500g/l
<i>Usage</i>	Herbicide

L'ATRAMAÏS 500 SC est un herbicide de prélevée efficace contre les dicotylédones et certaines graminées pour la culture de maïs.

MODE D'ACTION

L'ATRAMAÏS 500 SC est un herbicide contenant 500g/l d'atrazine, matière active de la famille des triazines, groupe HRAC-C1.

L'atrazine est absorbée principalement par les racines mais également par voie foliaire. Elle agit en inhibant le fonctionnement du photosystème II, ce qui entraîne l'arrêt de la photosynthèse chez les mauvaises herbes et leur disparition.

L'ATRAMAÏS 500 SC est efficace contre les dicotylédones et certaines graminées et a une persistance d'action de 2 à 6 mois.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Maïs	2.5-5 l/ha	Traiter sur sol humide en prélevée des adventices. Dose faible sur sol avec 0-10% d'argile et dose forte sur sol avec 41-55% d'argile.	n/a	48h
Canne à sucre	2.5 l/ha	Traiter sur sol humide en prélevée des adventices. Appliquer sur des sols contenant 0-35% d'argile.		
Ananas	3.7-5.2 l/ha	Traitement dirigé sur sol humide en prélevée des adventices. Dose faible sur sol avec 0-20% d'argile et dose forte sur sol avec 21-35% d'argile. Ne pas utiliser sur des sols lourds.		

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau au 1/3 de son volume.

Bien remuer le bidon et verser la quantité nécessaire d'ATRAMAÏS 500 SC. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu.

Précautions

Ne pas mélanger avec des substances oxydantes, des acides forts et des bases fortes.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de l'ATRAMAÏS 500 SC et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre.



savana

23, Chemin de la Forêt 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE
Téléphone: (33) 4 50 26 61 74
Fax: (33) 4 50 26 05 24
Email: info@savana-france.com
<http://www.savana-france.com>

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau, puis au savon et à l'eau. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.