

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	PENDISTAR 400 EC
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	400 g/l de pendimethaline
<i>Usage</i>	Herbicide

Le PENDISTAR 400 EC est un herbicide de prélevée, utilisable contre un grand nombre de dicotylédones et de graminées annuelles.

MODE D'ACTION

Le PENDISTAR 400 EC contient 400g/l de pendimethaline, matière active de la famille des toluidines, groupe HRAC-K1, inhibition de l'assemblage des microtubules.

Le PENDISTAR 400 EC est un herbicide de prélevée absorbé principalement par les racines. Il agit par inhibition de la division cellulaire au niveau des méristèmes des feuilles et des racines des jeunes plantules. Celles-ci sont détruites peu de temps après la germination ou après la levée. Le PENDISTAR 400 EC a une assez longue persistance d'action.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	3l/ha	Traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices.	60j	6h
Maïs, Mil, Sorgho	3l/ha			
Riz	4l/ha	Sur riz pluvial, traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices. Traiter 24-48h après repiquage sur riz irrigué.		
Tomate	3l/ha	Traitement en pré-plantation, suivi d'une incorporation par aspersion de 10 à 15 mm, ou une pluie équivalente dans les 48 heures suivant la pulvérisation. Plantation des tomates 24 à 48 heures après la pulvérisation et l'aspersion, sans autre façon		

		culturale intermédiaire. Le produit étant sélectif par sa position, éviter la chute de terre de surface vers le fond du trou de plantation.		
Oignon, Ail, Echalotte	3l/ha	Traiter en post-plantation et prélevée des adventices.	60j	6h
Chou, Poireau	3l/ha	Traiter en pré plantation sans incorporation.		
Niebe, Arachide, Haricot, Soja, Carotte	2l/ha	Traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices.		
Canne sucre à	5-6l/ha	Traiter en pré émergence de la canne.		

La dose d'emploi de PENDISTAR 400 EC varie selon la culture. Lors d'une première utilisation, pulvériser une petite partie de la culture afin de vérifier qu'il n'y a pas de problème de sélectivité.

Le traitement en post semis – prélevée doit être effectué le jour du semis ou dans les 24h maximum.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau à la moitié de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de PENDISTAR 400 EC. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Précautions

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du PENDISTAR 400 EC et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans (test 14 jours à 54°C). Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Cependant, si le médecin décide de nettoyer l'estomac, assurer l'évacuation gastrique en assurant la protection des voies respiratoires (risque de pneumopathie aux solvants).

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.