

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	CAF X GEL
Type de formulation	Appât en gel
Nom et teneur des matières actives	Imidaclopride à 2.15%
Usage	Gel anti-cafard

MODE D'ACTION

CAF X GEL agit par ingestion au niveau des récepteurs post synaptique, son usage est recommandé pour les habitations ainsi que pour le traitement des locaux et matériels de transport ...

CAF X GEL permet un contrôle rapide des infestations de blattes, son usage est recommandé pour le traitement des locaux et matériels de transport des produits d'origine végétale et animale (POV & POA) ainsi que dans les désinsectisations des locaux et matériels de collecte et de transport des ordures et déchets.

L'imidaclopride fait partie d'une nouvelle famille de molécules, les chloronicotinyl-nitroguanidines, seule famille d'insecticide agissant au niveau des récepteurs post synaptiques. Cette caractéristique en fait l'unique molécule contre les blattes dénuée de tout phénomène de résistance.

MODALITES D'EMPLOI

Appliquer le CAF X GEL dans les zones abritées chaudes et humides : recoins, fissures, plinthes, sous les éviers, derrière les appareils ménagers, à l'embouchure des gaines, des canalisations, dans les trappes de baignoires etc.

Important : lorsque le gel est entièrement consommé, refaire une application au même endroit.

Précautions

Refermer l'embout après utilisation.

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. Ne pas réutiliser les emballages vides.

BARS/RESTAURANTS/CANTINES

	Faible infestation	Forte infestation
Bar - comptoir	20 gouttes	40 gouttes
Restaurant - Cuisine	40 gouttes	120 gouttes

MAISONS/BUREAUX

	Faible infestation	Forte infestation
Cuisine	5 - 10 gouttes	10 - 15 gouttes
Salle de bain/WC	3 - 5 gouttes	6 - 8 gouttes
Chambre	2 - 4 gouttes	5 - 8 gouttes
Salle à manger	3 - 5 gouttes	8 - 15 gouttes

Ne pas oublier de traiter tous les tuyaux, arrivées d'eau ou d'électricité, faux-plafond et lambris (1 goutte tous les 2 à 3 mètres), chauffages, climatisation,...

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation

Mesure de première urgence

du produit concentré.

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen

d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter d'urgence un médecin si la douleur, les clignotements, le larmolement ou la rougeur persistent.

Ingestion : Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.