

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	DEKAT-D 720 SL
<i>Type de formulation</i>	SL – Concentré soluble
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	720 g/l de 2,4-D sel de diméthylamine
<i>Usage</i>	Herbicide

Le DEKAT-D 720 SL est un herbicide sélectif et systémique pour le contrôle des dicotylédones.

Le DEKAT-D 720 SL est efficace contre un grand nombre de dicotylédones annuelles et pérennes (Ageratum conzyoides, Amaranthus hybridus, Bidens bipinnata, etc ...)

MODE D'ACTION

Le DEKAT-D 720 SL est un herbicide sélectif et systémique, et contenant 720 g/l de 2,4-D, matière active de la famille des Alkylchlorophenoxy, groupe HRAC-O, homologue de l'auxine.

Le 2,4-D est un régulateur de croissance. Il imite le rôle de l'auxine, hormone de croissance des plantes, causant ainsi une croissance désorganisée des plantes. Le mode exact de l'action de 2,4-D n'est pas entièrement compris, et il est possible qu'il cause une série d'effets qui sont mortels pour les dicotylédones une fois combinés.

Le 2,4-D est facilement absorbé par les feuilles. Par translocation, la matière active s'accumule principalement dans les zones à méristèmes des racines et des bourgeons.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Riz	1l/ha	Traiter en post levée des adventices, du stade 3 feuilles à plein tallage du riz.	14j	48h
Canne à sucre	2l/ha	Traiter en post levée des adventices.		
Maïs, Mil, Sorgho	1l/ha			
Hévéa, Café, Palmier, Bananes	2.5l/ha	Traitement dirigé en post levée des adventices, de préférence en période de ralentissement de la croissance des arbres.		

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau au 1/3 de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de DEKAT-D 720 SL. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu.

Précautions

Ne pas mélanger avec des substances oxydantes, des acides forts et des bases fortes.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du DEKAT-D 720 SL et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau, puis au savon et à l'eau. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.