

GROUPE
savana



PENDISTAR® 455 CS

Herbicide de prélevée

Composition

Pendimethaline : 455 g/l

Famille chimique

Toluidines – HRAC-3

Formulation

CS – Suspension de capsules

Mode d'action

Contact

Cultures

Coton, maïs, oignon, riz, haricot...

Cible

Adventices monocotylédones et dicotylédones

Mode d'application

Traiter en pré plantation, post-semis/ prélevée, postlevée précoce (sur sol humide).

Dose

2.2-4 l/ ha

■ Formulation CS :

- Meilleure rémanence
- Dose d'emploi réduite
- Meilleure sélectivité

■ Efficacité :

Contrôle de très nombreuses monocotylédones et dicotylédones.

■ Polyvalence :

- Adapté à de très nombreuses cultures.
- Utilisable en pré plantation, post-semis/ prélevée, postlevée précoce.

Herbicide

PENDISTAR® 455 CS

Herbicide de prélevée

OBJECTIFS

Le désherbage de prélevée vise à empêcher la concurrence des adventices et garantir un rendement optimal.

PRINCIPALES ADVENTICES VISÉES

Monocotylédones : *Brachiaria birzantha*, *Chloris gayana*, *Chloris virgata*, *Chloris pycnotherix*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa colona*, *Echinochloa crus-galli*, *Eleusine corocana*, *Eragrostis spp.*, *Gisekia pharnacioides*, *Panicum schinzii*, *Panicum maximum*, *Rottboellia cochinchinensis*, *Setaria verticillata*, *Tragus berteronianus*, *Tragus racemosus*, *Urochloa panicoides*.

Dicotylédones : *Amaranthus hybridus*, *Amaranthus spinosus*, *Amaranthus thunbergii*, *Chenopodium album*, *Portulaca oleracea*, *Richardia brasiliensis*.

EXEMPLES :

Monocotylédones



Brachiaria spp.



Dactyloctenium aegyptium



Eragrostis spp.



Rottboellia cochinchinensis

Dicotylédones



Amaranthus hybridus



Portulaca oleracea

MODE D'ACTION

PENDISTAR 455 CS contient 455g/l de pendimethaline, matière active de la famille des toluidines, groupe HRAC-3, inhibition de l'assemblage des microtubules.

PENDISTAR 455 CS est un herbicide de prélevée absorbé principalement par les racines, les cotylédons et dans une moindre mesure par les feuilles. Il agit par inhibition de la division et de l'allongement cellulaire au niveau des méristèmes des feuilles et des racines des jeunes plantules. Celles-ci sont détruites peu de temps après la germination ou après la levée. **PENDISTAR 455 CS** a une assez longue persistance d'action.

MODE D'EMPLOI

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	2.4 l/ha	Traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices.	60j	6h
Maïs, Mil, Sorgho	2.2 l/ha			
Riz	3.5 l/ha	Sur riz pluvial, traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices. Traiter 24-48h après repiquage sur riz irrigué.		
Oignon, Ail, Echalotte	2.2 l/ha	Traiter en pré plantation ou 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices.		
Chou, Poireau	2.2 l/ha	Traiter en pré plantation sans incorporation.		
Niebe, Arachide, Haricot, Soja, Carotte	2.2 l/ha	Traiter 24-48h après le semis de la culture, avant la levée des adventices.		
Canne à sucre	4-5 l/ha	Traiter en pré émergence de la canne.		

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **PENDISTAR 455 CS** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Autres conseils : Le traitement en post semis – prélevée doit être effectué le jour du semis ou dans les 24-48h maximum.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits