

## NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	<b>BENTAGO 480 SL</b>
<i>Type de formulation</i>	SL – Concentré soluble
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	480g/l de bentazone
<i>Usage</i>	Herbicide

Le BENTAGO 480 SL est un herbicide de contact de post-levée, utilisable contre un grand nombre de dicotylédones et contre les cypéracées.

### MODE D'ACTION

Le BENTAGO 480 SL contient 480g/l de bentazone, matière active de la famille des benzothiadiazones, groupe HRAC-6.

Le BENTAGO 480 SL est un herbicide de contact de post-levée absorbé principalement par la cuticule et les stomates des jeunes feuilles. La bentazone fait preuve d'une certaine mobilité dans la plante (dans le sens acropétal) et agit en bloquant la photosynthèse. L'efficacité est d'autant plus améliorée que les plantes sont en croissance active.

### MODALITES D'EMPLOI

#### Doses d'application recommandées

Le traitement à base de BENTAGO 480 SL se fait à une dose variant de 1 à 3l/ha. Les adventices sont sensibles du stade plantule au stade 4-6 feuilles. Néanmoins, afin de garantir le maximum d'efficacité du produit, il est recommandé de traiter au stade 2-3 feuilles des adventices et dans des conditions poussantes.

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Maïs, Mil, Sorgho	1.5-2.5l/ha	Traiter au stade 2-3 feuilles des adventices. Limite d'emploi : intervenir sur des plantes en conditions poussantes Soja : traiter sur des plants ayant au moins une feuille trifoliée étalée.	60j	48h
Pomme de terre, Soja	1.5-2.5l/ha			
Riz	2-3l/ha		42j	
Haricot, Niébé, Pois, oignon	1-2l/ha			
Prairies installées	1.5-2.5l/ha		Nc	
PPAMC	0,6-1l/ha		28j	

### Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau à la moitié de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de BENTAGO 480 SL. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

### Précautions

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du BENTAGO 480 SL et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

### AUTRES INFORMATIONS

#### Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver dans le récipient d'origine bien fermé.

#### Mesures de sécurité

##### Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage pharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

#### *Mesure de première urgence*

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire 1-2 verres d'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

#### *Antidote et équivalents*

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.