

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	OZANA
<i>Type de formulation</i>	OD – Suspension huileuse
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Trifloxysulfuron sodium 11g/l
<i>Usage</i>	Herbicide

OZANA est un herbicide de post-levée systémique, sélectif du coton, utilisable principalement contre les adventices dicotylédones.

MODE D'ACTION

OZANA contient 11g/l de trifloxysulfuron-sodium, matière active de la famille des sulfonylurées, groupe HRAC-B.

Absorbé principalement par les feuilles mais également par les racines, OZANA est doté de propriétés systémiques et est véhiculé par le phloème et le xylème. Le trifloxysulfuron-sodium agit en bloquant la synthèse des acides aminés essentiels à la division cellulaire ce qui provoque un arrêt de croissance immédiat. OZANA induit des jaunissements ou rougissements qui se transforment en nécroses et provoquent ainsi la disparition progressive des adventices.

Les symptômes apparaissent 8-10j après l'application.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Le traitement à base de OZANA se fait à une dose moyenne de 1l/ha. Les dicotylédones adventices sont sensibles à partir de la levée. Néanmoins, afin de garantir le maximum d'efficacité du produit, il est recommandé de traiter au stade 3-5 feuilles des adventices et dans des conditions poussantes (sol humide).

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau à la moitié de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de OZANA. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Précautions

Ne pas traiter sur des cotonniers avant le stade 5 feuilles.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du OZANA et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans.(test 14 jours à 54°C).Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Cependant, si le médecin décide de nettoyer l'estomac, assurer l'évacuation gastrique en assurant la protection des voies respiratoires (risque de pneumopathie aux solvants).

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.