

GROUPE
savana



Composition

Quizalofop-P-ethyl : 100 g/l

Famille chimique

Aryloxyphenoxypropionates – HRAC-1

Formulation

EC – Emulsion concentrée

Mode d'action

Systémique

Cultures

Maraîchères et Vivrières

Cible

Graminées annuelles et perenne

Mode d'application

Traiter au stade 3-5 feuilles des graminées. Limite d'emploi : intervenir sur des plantes en conditions poussantes (sol humide).

Dose

0,9 l/ ha

KIZA®

Herbicide anti-graminée de post-levée

- *Utilisable sur toutes les cultures à feuilles larges et les oignons*
- *Limite la compétition des mauvaises herbes*
- *Facilite les sarclages*
- *Une solution technique et économique*

Herbicide

KIZA®

Herbicide anti-graminée de post-levée

OBJECTIFS

Le désherbage de post-levée vise à empêcher la concurrence des adventices et de garantir un rendement optimal.

PRINCIPALES ADVENTICES VISÉES

Monocotylédones (graminées) : *Brachiaria diffusa*, *Brachiaria deflexa*, *Brachiaria lata*, *Cynodon dactylon*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Digitaria horizontalis*, *Echinochloa colona*, *Eleusine indica*, *Eragrostis aspera*, *Paspalum scrobiculatum*, *Pennisetum pedicellatum*, *Rottboellia exaltata*, *Setaria pallide-fusca*.

EXEMPLES :



Brachiaria spp.



Digitaria horizontalis



Echinochloa colona



Eragrostis aspera



Rottboellia exaltata



Setaria pallide-fusca

MODE D'ACTION

KIZA contient 100g/l de quizalofop-p-ethyl, matière active de la famille des « fops » (aryloxyphenoxypropionates), groupe HRAC-1.

KIZA est un herbicide de post-levée absorbé principalement par voie foliaire mais également par les racines. Il a des propriétés systémiques qui lui permettent d'être véhiculé par la sève vers les tissus méristématiques dont il inhibe la synthèse des lipides. De ce fait, la croissance des graminées adventices est immédiatement stoppée, même si les symptômes ne sont visibles qu'au bout de 10 jours. L'efficacité est d'autant plus améliorée que les plantes sont en croissance active.

MODE D'EMPLOI

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	0.9 l/ha	Traiter dès le stade de 3-5 feuilles des graminées. Limite d'emploi : intervenir sur des plantes en conditions poussantes (sol humide).	40j	24h
Oignon				
Arachide, Niébé,				
Igname, Pomme de terre, Cultures à feuilles larges				
Cultures fruitières, Cacao, Café, Palmier				

Soit une quantité de 45 ml de **KIZA** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits