

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	TURF
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Fluroxypyr 200g/l e.a.
<i>Usage</i>	Herbicide

Le TURF est un herbicide sélectif et systémique pour le contrôle des dicotylédones.

Le TURF est efficace contre un grand nombre de dicotylédones annuelles et pérennes (Ageratum conyzoides, Amaranthus hybridus, Bidens bipinnata, etc ...)

MODE D'ACTION

Le TURF est un herbicide sélectif et systémique, et contenant 200g/l de fluroxypyr équivalent acide, matière active herbicide de la famille des acides picoliniques, groupe HRAC-O, homologue de l'auxine. Le fluroxypyr est absorbé par les feuilles puis rapidement véhiculé par la sève dans les zones à méristèmes, où il induit des symptômes caractéristiques de type auxinique : désorganisation de la croissance et de l'élongation cellulaire. Ces symptômes peuvent apparaître 2 heures après le traitement mais le dessèchement complet des adventices peut prendre plusieurs semaines.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Maïs, Mil, Sorgho	0.5-1l/ha	Traiter en post levée des adventices, avant le stade 6 feuilles de la culture.	14j	48h
Palmier, Hévée, Café, Cacao	1-2/ha	Traitement dirigé en post levée des adventices, de préférence en période de ralentissement de la croissance des arbres.		

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau au 1/3 de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de TURF. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu.

Précautions

Ne pas mélanger avec des substances oxydantes, des acides forts et des bases fortes.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du TURF et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

Mesure de première urgence

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de

l'eau, puis au savon et à l'eau. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.