

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	LYSA 225 OD
<i>Type de formulation</i>	OD – Suspension huileuse
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Cyhalofop-butyl 200g/l Penoxsulam 25g/l
<i>Usage</i>	Herbicide

LYSA 225 OD est un herbicide de postlevée systémique, sélectif du riz, utilisable contre l'ensemble des adventices monocotylédones et dicotylédones.

MODE D'ACTION

LYSA 225 OD contient 200g/l de cyhalofop-butyl, matière active de la famille des « fops » (aryloxyphenoxypropionates), groupe HRAC-1 et 25g/l de penoxsulam, matière active herbicide de la famille des triazolopyrimidines, groupe HRAC-2.

Absorbé principalement par les feuilles mais également par les racines, LYSA 225 OD est doté de propriétés systémiques et est véhiculé par le phloème et le xylème. Ses 2 matières actives agissent à deux niveaux en bloquant la synthèse des acides aminés essentiels à la division cellulaire et en inhibant la synthèse des lipides ce qui provoque un arrêt de croissance immédiat. LYSA 225 OD induit des jaunissements ou rougissements qui se transforment en nécroses et provoquent ainsi la disparition progressive des adventices.

MODALITES D'EMPLOI

Doses d'application recommandées

Le traitement à base de LYSA 225 OD se fait à une dose moyenne de 1l/ha. Les graminées adventices sont sensibles à partir du stade 1 feuille et les dicotylédones à partir de la levée. Néanmoins, afin de garantir le maximum d'efficacité du produit, il est recommandé de traiter au stade 3-5 feuilles des adventices.

Riz pluvial : traiter par pulvérisation 15-25 jours après semis dans des conditions poussantes (sol humide).

Riz de bas-fond/Riz irrigué en semis direct : traiter par pulvérisation 15-25 jours après semis sur des adventices découvertes à 75% (1-2 cm d'eau).

Riz irrigué repiqué : traiter par pulvérisation (ou sur lame d'eau) 15-25 jours après repiquage sur des adventices découvertes à 75% (1-2 cm d'eau).

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau à la moitié de son volume.

Verser simplement la quantité nécessaire de LYSA 225 OD. En agitant, compléter la bouillie jusqu'au volume prévu. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Précautions

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation du LYSA 225 OD et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

DAR : 28j.

DRE : 6h.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. (Test 14 jours à 54°C). Conserver le récipient bien fermé dans son emballage d'origine.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages et pulvériser la bouillie sur la parcelle.

Mesure de première urgence

Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro d'urgence d'un centre antipoison ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement.

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou de l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, l'étiquette ou la fiche de données de sécurité si possible. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.