

GROUPE
savana



Composition

Quizalofop-p-éthyl : 35 g/l
Imazamox : 35 g/l

Famille chimique

Aryloxyphenoxypropionates – HRAC-1
Imidazolinones – HRAC-2

Formulation

EC – Emulsion Concentrée

Mode d'action

Systémique

Cultures

Haricot, Niébé, Pois, Soja, Arachide

Cible

Adventices monocotylédones et
dicotylédones

Mode d'application

Traiter au stade 2-3 feuilles des
adventices et dans des conditions
poussantes (sol humide).

Dose

0,5-1 l/ha

ZAMZAL® 70 EC

Herbicide systémique complet de post-levée

- **Performant et économique :**
Un seul passage suffit
- **Détruit toutes les mauvaises herbes :**
Feuilles fines et feuilles larges
- **Une solution unique** pour désherber les
champs de légumineuses

Herbicide

ZAMZAL® 70 EC

Herbicide systémique complet de post-levée

OBJECTIFS

Le désherbage de post-levée vise à empêcher la concurrence des adventices et garantir un rendement optimal.

PRINCIPALES ADVENTICES VISÉES

Monocotylédones : *Aegyptium*, *Bracharia lata*, *Bulbostylis barbata*, *Commelina benghalensis* L., *Commelina nigritana*, *Commelina forskalaei*, *Cyperus difformis* L., *Cyperus Iria* L., *Cyperus rotundus*, *Dactyloctenium*, *Digitaria horizontalis*, *Digitaria argillaceae*, *Echinochloa colona*, *Imperata cylindrica*, *Paspalum scrobiculatum* L., *Pennisetum* sp, *Rottboellia cochinchinensis*.

Dicotylédones : *Ageratum Conyzoides*, *Cleome viscosa* L., *Gomphrena celosoides* L., *Indigofera hirsuta* L., *Ipomea coptica*, *Oldenlandia corymbosa* L., *Spermacoce stachydea* DC.

EXEMPLES :

Monocotylédones



Bracharia spp.



Digitaria
argillaceae



Echinochloa
colona



Cyperus difformis

Dicotylédones



Ageratum
Conyzoides



Ipomea
coptica

ZAMZAL 70 EC s'emploie entre les stades 2-3 feuilles des adventices et en conditions poussantes (sol humide) et est efficace sur de nombreuses monocotylédones (à partir d'1 feuille) et dicotylédones (à partir de la levée).

MODE D'ACTION

ZAMZAL 70 EC contient 35g/l de quizalofop-p-ethyl, matière active de la famille des « fops » (aryloxyphenoxypropionates), groupe HRAC-1 et 35g/l d'imazamox, matière active de la famille des imidazolinones, groupe HRAC-2.

Absorbé principalement par les feuilles mais également par les racines, **ZAMZAL 70 EC** est doté de propriétés systémiques et est véhiculé par le phloème et le xylème. Ses 2 matières actives agissent à deux niveaux en inhibant la synthèse des lipides et en bloquant la synthèse d'ADN ce qui empêche la division cellulaire et provoque un arrêt de croissance immédiat. **ZAMZAL 70 EC** induit des jaunissements ou rougissements qui se transforment en nécroses et provoquent ainsi la disparition progressive des adventices.

Les symptômes apparaissent 8-10j après l'application, les adventices sont détruites au bout de 2-3 semaines.

MODE D'EMPLOI

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Haricot, Niébé, Pois, Soja, Arachide	0.5-1 l/ha	Haricot : traiter sur des plants entre le stade deux feuilles simple étalées et trois feuilles trifoliées. Soja, Arachide, Niébé : traiter sur des plants entre le stade deux feuilles et six feuilles. Traiter au stade 2-3 feuilles des adventices. Limite d'emploi : intervenir sur des adventices en conditions poussantes.	28j	24h

Soit une quantité de 25-50 ml de **ZAMZAL 70 EC** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **ZAMZAL 70 EC** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Autres conseils : **ZAMZAL 70 EC** doit être appliqué sur une culture en état de croissance régulière et en bon état végétatif. Ne pas traiter sur des plantes étant mal implantées, étant endommagées par des parasites ou souffrant de la sécheresse. Traiter sur des adventices en conditions poussantes à savoir avec une hygrométrie suffisante ou un sol humide.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits