

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	MEPRO
<i>Type de formulation</i>	SL – Concentré soluble
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Chlorure de mepiquat 250g/l
<i>Usage</i>	Régulateur de croissance - Herbicide

MEPRO est un régulateur de croissance utilisable en pulvérisation foliaire après dilution dans l'eau.

MODE D'ACTION

MEPRO contient 250g/l de mepiquat-chlorure, matière active de la famille des dérivés de pipéridine.

MEPRO est un régulateur de croissance systémique qui est principalement absorbé par les feuilles. Il agit en raccourcissant les entre-nœuds et la croissance des rameaux latéraux, entraînant un port de la plante plus compact. Par ailleurs, cette action permet au cotonnier d'améliorer le maintien des capsules sur les branches inférieures du plant. Enfin, les feuilles des plants traités prennent une couleur vert sombre, due à une concentration de chlorophylle.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Dans des conditions pluvieuses, l'objectif est de limiter la croissance végétative du cotonnier et d'améliorer sa production. La dose moyenne d'emploi du MEPRO est de 0.2l/ha.

Stratégies conseillées

Traitement de base : le MEPRO s'applique au début de la floraison des cotonniers.

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	0.2 l/ha	Traiter au début de la floraison càd sur des plants mesurant 45-60cm de haut.	na	12h

Recommandations d'emploi

MEPRO pouvant être mélangé aux insecticides, il est conseillé de l'appliquer en mélange extemporané autour de 60 jours après levée. L'application peut se faire en traitement unique ou en fractionnant la dose sur 2 traitements (0.1l/ha-0.1l/ha).

Les cotonniers traités ne doivent pas subir de stress hydrique au moment de l'application.

Préparation de la bouillie : s'agissant d'une formulation aqueuse, le MEPRO doit être ajouté dans la cuve de pulvérisation en dernier après que le mélange soit déjà homogène.

Précautions

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de MEPRO et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans.(test 14 jours à 54°C).Conserver le récipient bien fermé dans son emballage d'origine.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.

Rincer minutieusement les emballages et pulvériser la bouillie sur la parcelle.

Mesure de première urgence

Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro d'urgence

d'un centre antipoison ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement.

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou de l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, l'étiquette ou la fiche de données de sécurité si possible. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.