

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	ALPHACYGA
<i>Type de formulation</i>	EC – émulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Alphamethrine : 180g/l
<i>Usage</i>	Insecticide

MODE D'ACTION :

ALPHACYGA est un insecticide à très large spectre pour le coton, les cultures maraîchères, fruitières, florales et les PPAMC (Plantes à Parfum ; Arômes, Médicinales et Condiments).

ALPHACYGA contient 180g/l d'alphamethrine, matière active de la famille des pyréthrinoides, groupe IRAC-3a.

L'alphamethrine, agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes et à faible dose. Elle possède un effet choc et également un effet répulsif qui entraîne l'inhibition de la ponte chez les adultes et bloque la prise de nourriture chez les larves. Comme tous les pyrethrinoides de type II, elle agit en empêchant la fermeture des canaux sodium au niveau des cellules nerveuses ce qui entraîne une hyperexcitation nerveuse et la mort des insectes. Grâce à sa tension de vapeur très basse et à sa très bonne absorption cuticulaire, sa persistance d'action est de l'ordre de 3 à 4 semaines, même en conditions chaudes et ventées.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement du coton, des cultures maraîchères, fruitières, florales et PPAMC est important pour obtenir un bon rendement car elles sont particulièrement attractives pour les agents pathogènes et insectes parasites.

Principales cibles visées

ALPHACYGA permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes notamment les piqueurs-suceurs et les lépidoptères. ALPHACYGA peut être utilisé sur le coton, les légumes feuilles, fruits, le tabac, les arbres fruitiers et les cultures florales.

Stratégies conseillées

Pour le coton :

Culture	Usage	Dose	Indications	DAR	DRE
Coton	<i>Helicoverpa</i> , <i>Earias</i> , <i>Diparopsis</i> , <i>Syllepte</i>	0.1l/ha	Traiter de préférence au pic de vol pour les lépidoptères.	14j	48h

Pour les autres cultures (cultures maraîchères, riz, maïs...) :

Cible	Dose d'emploi	Indications d'emploi	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Petite Altise, Altise, Charançon, Cécidomyie, Tenthrede	0.05l/ha	Traiter de préférence au pic de vol pour les lépidoptères. Traiter dès les premières infestations pour les autres ravageurs.	7-21j	48h
Noctuelles, Teignes, Tordeuses, Piéride du chou, Pyrale des crucifères	0.07l/ha			
Pucerons, Thrips, Doryphore, Psylles, Cicadelles	0.1l/ha			
Pyrales, Sésamies, Thrips du poireau	0.2l/ha			

Traitement de base :

En traitement par pulvérisation, remplir le pulvérisateur avec 3/4 du volume d'eau nécessaire, rajouter la dose adéquate de *ALPHACYGA* et bien remuer. Compléter avec le volume d'eau nécessaire. Bien agiter pendant la durée du traitement.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de *ALPHACYGA* selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé dans son emballage d'origine.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des

denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et au chaud. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver abondamment les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se prolongent.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Consulter d'urgence un médecin si la rougeur persiste.

Ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.