



Composition

Acétamipride 250 g/kg

Famille chimique

Néonicotinoïde – IRAC-4a

Formulation

SP – poudre soluble

Mode d'action

Contact / Ingestion /
Systémique

Cultures

Toutes cultures (maraichères,
fruitières, florales et coton)

Cible

Pucerons, aleurodes,
mouches mineuses,...

Mode d'application

À l'apparition des ravageurs

Dose

100 g/ha

BENJI®

Insecticide systémique multicultures contre les piqueurs-suceurs

- Libère et protège les plantes des insectes piqueurs-suceurs
- Effet choc
- Économique, facile et sûr d'emploi
- Réduit significativement les risques de viroses

Insecticide

BENJI®

Insecticide systémique multicultures contre les piqueurs-suceurs

MODE D'ACTION

BENJI® contient 250g/kg d'acétamipride, insecticide de la famille des néonicotinoïdes, groupe IRAC 4a.

L'acétamipride, agit par contact et ingestion sur le système nerveux central des insectes, causant le blocage irréversible du récepteur nicotinique du neurotransmetteur acétylcholine. Il interrompt la transmission nerveuse chez les insectes, résultant en pulses rapides dues à un influx de sodium continu, causant hyper excitation, convulsions, paralysie et mort.

Son effet choc, ses propriétés translaminaires et systémiques lui confèrent une efficacité accrue sur les ravageurs cibles ainsi qu'une très bonne tenue au lessivage et une bonne persistance d'action.

PRATIQUES CULTURALES

Le traitement des cultures maraîchères, fruitières et florales ou du coton est important pour obtenir un bon rendement car elles sont particulièrement attractives pour les agents pathogènes et insectes parasites. **BENJI®** permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes piqueurs-suceurs (aleurodes, pucerons) ainsi que contre les mineuses et certains lépidoptères. **BENJI®** peut être utilisé sur les légumes feuilles, fruits, les arbres fruitiers et les cultures florales.

QUELS SONT LES PARASITES VISÉS ?



Cochenilles



Aleurodes



Cicadelles &
Jassides



Thrips



Pucerons



Mouches
mineuses

Stratégies conseillées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cultures maraîchères	100 g/ha	Traiter dès les premières infestations. Répéter l'application après 14j si nécessaire. 4 applications max. par campagne.	7j	6h
Cultures vivrières				

Recommandations d'emploi

Verser la moitié de l'eau dans le pulvérisateur. Ajouter BENJI® selon la dose recommandée et bien remuer le pulvérisateur. Compléter le remplissage avec de l'eau. Remuer régulièrement le pulvérisateur.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de BENJI® selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits