




Composition

Etoxazole : 150 g/kg

Famille chimique

Oxazolines – IRAC-10b

Formulation

WP – poudre mouillable

Mode d'action

Contact / Ingestion /
Translaminare

Cultures

Maraichères

Cible

Acariens

Mode d'application

Traiter dès les 1ères
infestations, ou dès le seuil de
3-5 formes mobiles atteint.
Limite d'emploi : 1 application
par campagne.

Dose

200 g/ha

ET*ILE® 150 WP

Acaricide foliaire

NOUVELLE GÉNÉRATION

- **EFFICACITÉ** : nouvelle matière active, nouveau mode d'action, efficace même sur les souches d'acariens résistantes aux organosporés et avermectines.
- **LUTTE INTÉGRÉE** : pas de résistance croisée avec les autres acaricides, mode d'action à utiliser en alternance.
- **ENVIRONNEMENT** : respecte la faune auxiliaire, faible quantité de matière active à l'hectare.
- **UTILISATION** : facile d'emploi, très bonne tenue au lessivage

Acaricide

ETOILE® 150 WP

Acaricide foliaire

OBJECTIFS

La plupart des cultures sont attaquées par des insectes parasites. Utiliser **ETOILE 150 WP** permet de protéger les cultures contre ces ravageurs et d'améliorer ainsi le rendement.

PRINCIPALES CIBLES VISÉES

ETOILE 150 WP permet de lutter efficacement contre les acariens. **ETOILE 150 WP** peut être utilisé sur les cultures maraîchères et vivrières.

Pour rappel : les acariens sont des arthropodes de la classe des Arachnides (comme les araignées) et ne sont pas des insectes. Plusieurs groupes d'acariens comprennent des espèces nuisibles, réparties en trois familles principales : les Tetranychidae ou araignées rouges, les Tarsonemidae (acariose déformante) et les Eriophyidae ou phytoptes (acariose bronzée).

Ces arthropodes n'ont jamais d'ailes ni d'antennes, et possèdent 2 à 4 paires de pattes selon les familles et les stades de développement. Ce sont des piqueurs-suceurs des cellules végétales, des feuilles, des fruits ou des tiges.

EXEMPLES :




Araignées rouges
(*Tetranychus* spp.)
Exp. dégât sur tomate



Acariose bronzée
(*Aculops lycopersici*)
Exp. dégât sur tomate



Acariose déformante
(*Tarsonème*)
Exp. dégât sur poivron



MODE D'ACTION

ETOILE 150 WP contient 150 g/kg d'etoxazole, matière active de la famille des oxazolines, groupe IRAC-10b.

ETOILE 150 WP est un acaricide foliaire qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Il agit par contact sur les œufs en perturbant la formation de leurs organes de respiration et sur les larves d'acariens en inhibant le processus de la mue. De plus il induit la stérilisation des femelles par une action transovarienne. Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue (action sur parasites situés sous les feuilles), une grande persistance d'action (jusqu'à 2 mois) ainsi qu'une très bonne résistance au lessivage.

ETOILE 150 WP possède un mode d'action unique : il agit comme un inhibiteur de croissance chez les acariens.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cultures maraîchères	Acariens	200 g/ha	Traiter dès les 1ères infestations ou dès le seuil de 3-5 formes mobiles atteint. Limite d'emploi : 1 application par campagne	3j	8h

Soit un sachet de 10g de **ETOILE 150 WP** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **ETOILE 150 WP** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits