23, Chemin de la Forêt 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE
Téléphone: (33) 4 50 26 61 74
Fax: (33) 4 50 26 05 24
Email: info@savana-france.com
http://www.savana-france.com

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	**IMIDA 30 EC**
Type de formulation	EC – Emulsion concentrée
Nom et teneur des matières actives	**Imidacloprid à 30 g/l**
Usage	Insecticide

MODE D'ACTION

IMIDA 30 EC contient 30 g/l d'imidaclopride matière active de la famille des chloronicotiniles, groupe IRAC-4A.

L'imidaclopride est une matière active systémique qui agit par contact et ingestion contre les insectes piqueurs-suceurs (mirides, pucerons, mouches blanches, cicadelles, cochenilles, etc) et les insectes broyeurs (coléoptères, mineuses etc.). Son mode d'action par perturbation de la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse diffère de celui des pyrethrinoïdes ou des carbamates ce qui en fait un excellent produit d'alternance. Ses caractéristiques systémiques lui permettent d'être efficace notamment sur les insectes situés sous les feuilles ou à l'intérieur.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement des cultures de cacao, café, des cultures maraichères, vivrières, fruitières et florales est important pour obtenir un bon rendement car elles sont particulièrement attractives pour les agents pathogènes et insectes parasites.

Principales cibles visées

IMIDA 30 EC permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes. IMIDA 30 EC peut être utilisé sur les légumes feuilles, fruits, le niébé, le tabac, les palmiers, les cacaoyers, les arbres fruitiers et les cultures florales.

Stratégies conseillées

La dose préconisée varie selon les degrés d'infestation et l'environnement des plantations.

SAVANA

23, Chemin de la Forêt 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE
Téléphone: (33) 4 50 26 61 74
Fax: (33) 4 50 26 05 24
Email: info@savana-france.com
http://www.savana-france.com

Traitement de base :

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Cacao, café, palmier	Mirides, foreurs de tige, cochenilles, fourmis, coelaenomenodera	1-2l/ha	Traiter selon les avertissements agricoles ou dès les premières infestations. Limite d'emploi : 4 applications/an max	14j	6h
Culture fruitières	Cochenilles, fourmis	1-2l/ha			
Cultures maraîchères	Pucerons, cicadelles, mouches blanches, thrips, cochenilles	1-3l/ha		7j	
Cultures ornementales	Pucerons, cicadelles, mouches blanches, thrips, cochenilles	1-3l/ha			
Cultures vivrières	Cochenilles, fourmis, charançons	1-2l/ha			

En traitement par pulvérisation ou atomisation, commencer par diluer IMIDA 30 EC dans environ 1/3 du volume d'eau nécessaire, bien mélanger et rajouter de l'eau en remuant la bouillie jusqu'à avoir le volume désiré pour le traitement.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de IMIDA 30 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

23, Chemin de la Forêt 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE
Téléphone: (33) 4 50 26 61 74
Fax: (33) 4 50 26 05 24
Email: info@savana-france.com
http://www.savana-france.com

	Ne pas réutiliser les emballages vides. Après le traitement, changer de vêtements et se laver. Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique. Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage. Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.
Mesure de première urgence	Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent. Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter d'urgence un médecin si la douleur, les clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent. Ingestion : Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.
Antidote et équivalents	Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.