

GROUPE  
**savana**



# JA FIRE® 500 WG

Insecticide spécifique contre les piqueurs-suceurs

## Composition

Flonicamide : 500 g/kg

## Famille chimique

Pyridine-carboxamides – IRAC-29

## Formulation

WG – granulés dispersibles

## Mode d'action

Contact / Ingestion / Systémique

## Cultures

Coton, Cultures maraîchères...

## Cible

Piqueurs-suceurs

## Mode d'application

Traiter dès l'apparition des ravageurs cibles. Répéter l'application après 14j, si nécessaire. 3 applications max par cycle de culture en fonction des attaques.

## Dose

100 g/ha

- **EFFICACITÉ** : nouvelle matière active, nouveau mode d'action, efficace même sur les souches de piqueurs-suceurs résistantes aux néonicotinoïdes.
- **LUTTE INTÉGRÉE** : sans effet sur les arthropodes utiles. Ne détruit pas les auxiliaires.
- **ENVIRONNEMENT** : pas de bioaccumulation.
- **UTILISATION** : facile d'emploi, très bonne persistance d'action (3 semaines).

Insecticide

# JAZZFIRE<sup>®</sup> 500 WG

## Insecticide spécifique contre les piqueurs-suceurs

### OBJECTIFS

La plupart des cultures sont attaquées par des insectes parasites. Utiliser **JAZZFIRE 500 WG** permet de protéger les cultures contre ces ravageurs et d'améliorer ainsi le rendement.

### PRINCIPALES CIBLES VISÉES

**JAZZFIRE 500 WG** permet de lutter principalement contre les piqueurs-suceurs (Jassides, Aleurodes, Pucerons, Thrips...).

Pour rappel : les piqueurs-suceurs sont des insectes se nourrissant de la sève des végétaux en piquant les feuilles et/ou les jeunes rameaux. Ils causent des dégâts lorsqu'ils sont à l'état larvaire et également au stade adulte. Les conséquences néfastes pour les plantes sont nombreuses.

Les types de dégâts et symptômes rencontrés sont : cellules évidées, sève aspirée, feuilles dépigmentées prenant un aspect plombé (grisâtre ou blanchâtre), ou bien jaunissantes avec chute prématurée. On assiste parfois à la déformation des feuilles ou des pousses et à des perturbations physiologiques, en réaction à l'injection de toxines lors des piqûres de nutrition.

### EXEMPLES :



**Jassides**  
Exp. dégât sur coton



**Aleurodes**  
Exp. dégât sur tomate



**Pucerons**  
Exp. dégât sur aubergine



### MODE D'ACTION

**JAZZFIRE 500 WG** contient 500g/kg de flonicamide, insecticide de la famille des pyridine-carboxamides, groupe IRAC 29.

Le flonicamide, agit par contact et ingestion en modulant la réponse nerveuse des organes chordotonaux. Dans le cas du flonicamide, la perturbation des signaux à ces organes, présents uniquement chez les insectes, fait que les individus touchés arrêtent immédiatement de s'alimenter puis meurent de faim.

Ses propriétés translaminaires et systémiques lui confèrent une efficacité accrue sur les ravageurs cibles ainsi qu'une très bonne tenue au lessivage et une bonne persistance d'action. Par ailleurs, son mode d'action spécifique fait que le **JAZZFIRE 500 WG** est sans danger pour les auxiliaires des cultures.

### MODE D'EMPLOI

| Culture                                                 | Usage                                                                       | Dose préconisée | Indications d'utilisation                                                                                                   | Délai avant récolte | Délai de rentrée |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Coton                                                   | Jassides,<br>Aleurodes,<br>Pucerons,<br>Thrips,<br>Punaises,<br>Cochenilles | 100 g/ha        | Traiter dès l'apparition des ravageurs cibles. Renouveler l'application après 14j si nécessaire. 3 appl. Max. par campagne. | 7j                  | 6h               |
| Tomate, Poivron,<br>Piment, Aubergine,<br>Cucurbitacées |                                                                             |                 |                                                                                                                             | 1j                  |                  |
| Haricots, Pois,<br>Pomme de terre                       |                                                                             |                 |                                                                                                                             | 14j                 |                  |

Soit un sachet de 50g de **JAZZFIRE 500 WG** pour traiter 1/2 ha.

**Conseils d'utilisation** : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **JAZZFIRE 500 WG** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

**Stockage** : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

**Précautions** : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code  
pour en savoir plus  
sur nos produits