



Composition

Enamectine benzoate : 60 g/kg
Teflubenzuron : 75 g/kg

Famille chimique

Avermectines – IRAC-6
Benzoylurées – IRAC-15

Formulation

WG – granulés dispersibles

Mode d'action

Contact / Ingestion /
Translaminare

Cultures

Coton, Maïs et Maraîchage

Cible

Chenilles

Mode d'application

Traiter juste avant ou au
moment de l'éclosion des œufs.
Répéter l'application après 14j
si nécessaire. 4 applications
max par cycle de culture en
fonction des attaques.

Dose

200 g/ha

TEMA®

Insecticide double action contre les chenilles

Un traitement précoce avec le TEMA les chenilles trépassent

■ 1 Solution 2 en 1 super efficace :

- 2 matières actives combinées
- 2 nouveaux modes d'action
- Pénètre les feuilles
- Résiste au lessivage

■ Un conditionnement adapté à chaque producteur



HORIZON PHYTO PLUS

Avec HPP, Vous avez droit au Meilleur !

Siège social : Z.I Douala - Bonaberi, face Cimencam
Agences : Garoua - Yaoundé - Ngaoundéré - Bafoussam
B.P : 2131 Douala - Cameroun
Tél. : + 237 233 43 69 84 / +237 243 19 29 12
E-mail : horizonphyto@horizonphytoplus.com

Insecticide

TEMA®

Insecticide double action contre les chenilles

OBJECTIFS

La plupart des cultures sont attaquées par des insectes parasites. Utiliser **TEMA** permet de protéger les cultures contre ces ravageurs et d'améliorer ainsi le rendement.

PRINCIPALES CIBLES VISÉES

TEMA permet de lutter efficacement contre les chenilles de lépidoptères.

EXEMPLES :



Chenilles
Carpophages



Chenilles
Phyllophages



Chenilles
Foreuses

MODE D'ACTION

TEMA contient 60g/kg d'emamectine benzoate, matière active de la famille des avermectines, groupe IRAC-6, et 75g/kg de teflubenzuron, matière active de la famille des benzoylurées, groupe IRAC-15.

TEMA est un insecticide larvicide qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Il agit par ingestion. Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue sur un grand nombre de chenilles de lépidoptères, une bonne persistance d'action vis-à-vis de ce type de ravageurs (de l'ordre de 15j), ainsi qu'une très bonne résistance au lessivage.

L'emamectine benzoate agit au niveau neuromusculaire en se fixant de manière irréversible au niveau du récepteur GABA et sur le récepteur Glutamate H. Il en résulte une inhibition irréversible de la contraction musculaire des insectes qui entraîne une paralysie (effet choc), conduisant à un arrêt de l'alimentation et ainsi à l'arrêt immédiat des dégâts.

Le teflubenzuron agit en perturbant le dépôt de chitine dans la cuticule. Les larves cessent très rapidement de s'alimenter et meurent au moment de la mue car la cuticule ne peut pas résister à la tension musculaire et à la turgescence.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	Chenilles	200 g/ha	Traiter juste avant ou au moment de l'éclosion des œufs.	7j	8h
Maïs, Mil, Sorgho			Répéter l'application après 14j si nécessaire.	10j	
Maraîchage			4 applications max par cycle de culture en fonction des attaques.		

Soit :

- **Zone nord** : 100g de **TEMA** par pulvérisateur de 5l d'eau, pour un volume de bouillie de 10l/ha.
- **Zone sud** : 10g de **TEMA** par pulvérisateur de 15l d'eau, pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **TEMA** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits