

## NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	<b>FINISH 360 SL</b>
<i>Type de formulation</i>	SL – Concentré soluble
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Glyphosate acide 360 g/l
<i>Usage</i>	Herbicide total

FINISH 360 SL est un herbicide total non sélectif agissant sur presque toutes les adventices annuelles ou vivaces.

### MODE D'ACTION

FINISH 360 SL, herbicide total non sélectif, contient 480g/l de glyphosate sel d'isopropylamine (équivalent 360g/l de glyphosate acide), matière active de la famille des amino-phosphonates ou glycines, groupe HRAC-9.

Absorbé essentiellement par voie foliaire, FINISH 360 SL est doté de propriétés systémiques et est véhiculé par le phloème jusqu'aux racines et aux rhizomes. Le glyphosate bloque la synthèse des acides aminés aromatiques (EPSP synthase) ce qui induit des jaunissements qui se transforment en nécroses et provoque ainsi la disparition des herbes en 10-14j.

FINISH 360 SL est détruit au contact du sol et n'a pas d'activité résiduelle.

### MODALITES D'EMPLOI

#### Objectifs

Le désherbage total est utile soit en traitement en plein pour assainir une parcelle avant le semis, soit en traitement dirigé pour limiter la proliférations des mauvaises herbes.

## Stratégies conseillées

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	1-2.5l/ha	Traiter en post-levée des adventices et avant le semis du coton	n/a	24h
Riz	4l/ha	Destruction du riz sauvage à rhizome en pré-plantation de la culture, 1 mois après la 1 <sup>ère</sup> pré-irrigation. Limite d'emploi : repiquage des plants 2 semaines après la dernière application minimum.		
Maïs, Mil, Sorgho	1.5-2.5/ha	Traiter en post-levée des adventices et avant le semis de la culture		
Palmier à huile, Hévéa	3l/ha	Traitement dirigé localisé par spot. Limitation du <i>Pueraria</i> en couronne autour des ronds d'infestation en 2 à 3 applications par an.		
Caféier, Cacaoyer, Avocatier	3-6l/ha	Traitement localisé dans l'interligne sur adventices en croissance active (après début saison des pluies).		
Bananier, Ananas, Agrumes	3-6l/ha	Traitement dirigé pour lutter contre les adventices pérennes difficiles.		
Canne à sucre	3-6l/ha	Traitement en pré-plantation ou avant la repousse des boutures. Traitement dirigé en présence de cannes		

## Recommandations d'emploi

FINISH 360 SL doit être appliqué lorsque les mauvaises herbes sont bien développées, dégagées et en croissance active. Seules les herbes ayant des feuilles vertes au moment de l'application peuvent être détruites. Il n'y a pas d'activité résiduelle. Éviter absolument tout contact avec le feuillage des plantes cultivées par projections ou embruns.

Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas mélanger avec des insecticides ou des fongicides.

Ne pas appliquer de chaux, engrais ou fumier pendant les huit jours suivant l'application.

Ne pas stocker ou laisser séjourner la solution dans des récipients galvanisés ou acier doux, un gaz hautement inflammable peut se former.

Autres précautions d'usage : toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de FINISH 360 SL et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

## Précautions

*Nettoyage du matériel après pulvérisation* : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

## AUTRES INFORMATIONS

### Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans.(test 14 jours à 54°C).Conserver le récipient bien fermé.

### Mesures de sécurité

#### *Précautions à prendre*

Eviter tout contact avec les yeux et la peau  
Ne pas avaler ou respirer le produit et/ou la bouillie.  
Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.  
Ne pas réutiliser les emballages vides.  
Après le traitement, changer de vêtements et se laver.  
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.  
Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.  
Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.  
Garder les bidons bien ventilés et loin de toute source d'ignition.  
Rincer minutieusement les emballages, vider l'eau de lavage dans un réservoir stocké en toute sécurité.

#### *Mesure de première urgence*

Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro d'urgence d'un centre antipoison ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement.

Inhalation : Mettre la victime à l'air libre. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter un médecin si nécessaire.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement la peau avec de l'eau, puis au savon et à l'eau. Les vêtements contaminés doivent être blanchis avant réutilisation.



savana

---

23, Chemin de la Forêt 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE  
Téléphone: (33) 4 50 26 61 74  
Fax: (33) 4 50 26 05 24  
Email: [info@savana-france.com](mailto:info@savana-france.com)  
<http://www.savana-france.com>

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec une solution oculaire ou de l'eau claire en maintenant les paupières écartées pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste

Ingestion En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, l'étiquette ou la fiche de données de sécurité si possible. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir.

#### *Antidote et équivalents*

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement. Ce produit n'inhibe pas l'acétylcholinestérase et les traitements à l'atropine ou aux oximes ne sont pas indiqués.