

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

| | |
|---|--|
| <i>Nom</i> | PROTECT DP |
| <i>Type de formulation</i> | DP – Poudre pour poudrage |
| <i>Nom et teneur des matières actives</i> | Pyrimiphos-méthyl : 1.5% Deltaméthrine : 0.1% |
| <i>Usage</i> | Insecticide |

Le PROTECT DP est un insecticide complet prêt à l'emploi pour le traitement à sec des denrées stockées.

MODE D'ACTION :

Le PROTECT DP est un insecticide à très large spectre contenant 1.5% de pyrimiphos-méthyl, matière active de la famille des organophosphorés (groupe IRAC-1B) et 0.1% de deltaméthrine, matière active de la famille des pyrethrinoides (groupe IRAC-3A).

Le pyrimiphos-méthyl agit par contact et par vapeur. Il a une action sur Coléoptères, Pucerons et Acariens. Sa persistance d'action est de plusieurs mois en application sur grains stockés.

La deltaméthrine, agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes et à faible dose. Elle possède un effet choc et également un effet répulsif qui entraîne l'inhibition de la ponte chez les adultes et bloque la prise de nourriture chez les larves. Sa persistance d'action est de plusieurs mois en application sur grains stockés.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement des grains stockés est indispensable pour éviter de perdre ses récoltes.

Principales cibles visées

PROTECT DP permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes notamment les coléoptères, les lépidoptères et les acariens. PROTECT DP peut être utilisé sur l'ensemble des grains stockés.

Stratégies conseillées

La dose préconisée est de 50g pour 100kg de grains.

| Cible | Dose d'emploi | Indications d'emploi |
|--|---------------------|---|
| Alucite, Capucins, Charançons, Teignes, Vers de farine, Silvains, Tribolium, Bruches | 50g/100kg de grains | <p><u>Stockage en sac :</u> Poudrer les greniers, puis poudrer les grains avant remplissage des sacs, puis poudrer les sacs.</p> <p><u>Stockage maïs en épis :</u> Poudrer les greniers, puis poudrer les épis par couches successives.</p> |

Traitement de base :

En traitement par poudrage à sec, il est important de traiter les grains stockés, aussi bien que les locaux de stockage.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de PROTECT DP selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé dans son emballage d'origine.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

- Eviter tout contact avec les yeux et la peau
- Ne pas avaler ou respirer le produit.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.
- Ne pas réutiliser les emballages vides.
- Après le traitement, changer de vêtements et se laver.
- Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.
- Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.
- Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et au chaud. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver abondamment les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se prolongent.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes. Consulter d'urgence un médecin si la rougeur persiste.

Ingestion : Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.