

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	PERMEKILL
<i>Type de formulation</i>	EC – émulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Permethrine: 200g/l
<i>Usage</i>	Insecticide hygiène publique

MODE D'ACTION

PERMEKILL contient 200g/l de permethrine, insecticide de la famille des pyrethrinoides, groupe IRAC 3a.

PERMEKILL agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes et à faible dose. Il possède une action aussi bien sur les œufs que sur les larves et les adultes d'un grand nombre d'insectes et notamment les simulies et les moustiques.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement des eaux est indispensable dans le domaine de l'hygiène publique afin de limiter les risques de maladies.

Principales cibles visées

PERMEKILL permet de lutter efficacement contre les larves de nombreux insectes vecteurs de maladies, simulies et moustiques notamment.

Stratégies conseillées

Cible	Dose préconisée	Indications d'utilisation
Simulies	0.75ppm pendant 1min	Application de 0.75ppm pendant 1 minute soit 45ml pour 1m ³ /s.
Moustiques, gîtes larvaires	0.05-0.2 l/ha	Pour traiter 100m ² d'eau, mélanger 0.5-2ml dans 1 litre d'eau.

Traitement des surfaces :

Contre les insectes rampants

Précautions

Le PERMEKILL est réservé à un usage strictement professionnel. Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de PERMEKILL selon les bonnes pratiques d'hygiène et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau claire les parties exposées de la peau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin.

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Aucun antidote spécifique n'est connu. Traiter symptomatiquement.