

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	TEMEKILL
<i>Type de formulation</i>	EC – émulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Temephos: 500g/l
<i>Usage</i>	Insecticide hygiène publique

MODE D'ACTION

TEMEKILL contient 500g/l de temephos, insecticide de la famille des organophosphorés, groupe IRAC 1b.

TEMEKILL, agit par contact et ingestion sur le système nerveux central, en tant qu'inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Il possède une action aussi bien sur les œufs que sur les larves et les adultes d'un grand nombre d'insectes et notamment les simules et les moustiques.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le traitement des eaux est indispensable dans le domaine de l'hygiène publique afin de limiter les risques de maladies.

Principales cibles visées

TEMEKILL permet de lutter efficacement contre les larves de nombreux insectes vecteurs de maladies, simules et moustiques notamment.

Stratégies conseillées

Cible	Dose préconisée	Indications d'utilisation
Simules	2ppm pendant 1min	Application de 2ppm pendant 1 minute soit 120ml pour 1m ³ /s.
Moustiques, gîtes larvaires	0.1-0.5 l/ha	Pour traiter 100m ² d'eau, mélanger 1-5ml dans 1 litre d'eau.

Précautions

Le TEMEKILL est réservé à un usage strictement professionnel. Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de TEMEKILL selon les bonnes pratiques d'hygiène et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau
Ne pas avaler ou respirer le produit.
Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.
Ne pas réutiliser les emballages vides.
Après le traitement, changer de vêtements et se laver.
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.
Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.
Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement un médecin.
Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau claire les parties exposées de la peau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste. Laver les vêtements avant réutilisation.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin.
Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Atropine : injection de 2 à 4 mg d'atropine sulfate (pour les enfants 0.5 à 2 mg) toutes les 10-15 minutes. Le patient doit resté sous atropine pendant un certain temps (24 à 48 heures) pour prévenir l'empoisonnement dû à la résorption tardive.