

## NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <i>Nom</i>                                | <b>MOCID</b>   |
| <i>Type de formulation</i>                | GR - Granulés  |
| <i>Nom et teneur des matières actives</i> | Métaldéhyde 5% |
| <i>Usage</i>                              | Molluscicide   |

MOCID est une formulation prête à l'emploi recommandée pour le traitement contre les mollusques.

MOCID: une réponse adaptée aux exigences des filières

- Efficacité : efficacité accrue par l'appétence des granulés.
- Environnement : sélectif de toutes les espèces de limaces et escargots, n'influe pas sur la biomasse de vers de terre ni sur celle des prédateurs des limaces et escargots.
- Utilisation : facile d'emploi, bonne tenue au délitage et persistance d'action

### MODE D'ACTION :

MOCID contient 50 g/kg de métaldéhyde.

MOCID agit par ingestion ou par contact sur le pied des limaces qu'il engourdit en peu de temps, provoquant chez ces gastéropodes une importante sécrétion de mucus. Les limaces ayant absorbé le produit ne peuvent pas se réhydrater ; elles sont définitivement détruites.

Les granulés de MOCID sont spécialement conçus pour résister au délitage ce qui confère une bonne persistance d'action au produit même en conditions humides. D'autre part, leur appétence stimule leur consommation par les mollusques.

### MODALITES D'EMPLOI

#### Objectifs

La protection phytosanitaire contre les limaces et les escargots est particulièrement importante car ce sont des ravageurs ayant un fort impact sur le rendement.

#### Principales cibles visées

MOCID permet de lutter efficacement contre toutes les espèces de limaces et d'escargots.

### Stratégies conseillées

| Culture         | Usage              | Dose préconisée        | Indications d'utilisation                | Délai avant récolte | Délai de rentrée |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Toutes cultures | Limaces, Escargots | 5g/plt                 | Répartir le produit autour du plant.     | 3j                  | nc               |
|                 |                    | 75g/100m <sup>2</sup>  | Traitement sur ou dans la raie de semis. |                     |                  |
|                 |                    | 150g/100m <sup>2</sup> | Traitement en plein.                     |                     |                  |

#### Recommandations :

- En conditions de fortes pluies, renouveler l'application 12 à 15 jours après la première application.
- Ne jamais disposer les granulés de MOCID en tas mais épandre régulièrement sur la surface à traiter.

### Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de MOCID selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

### AUTRES INFORMATIONS

#### Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

### Mesures de sécurité

#### Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau  
Ne pas avaler ou respirer le produit.  
Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.  
Ne pas réutiliser les emballages vides.  
Après le traitement, changer de vêtements et se laver.  
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.  
Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.  
Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré et de la bouillie.

#### Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration

artificielle. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon les parties exposées de la peau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières pendant 15 min. Consulter d'urgence un médecin.

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin. Si la victime est consciente, boire 1 ou 2 verres d'eau.

#### *Antidote et équivalents*

Pas d'antidote connu. Traiter symptomatiquement.